

女性激素软膏

第二类医药品

使用前请阅读本说明书并保管好，以便需要时查阅。

巴斯特敏®

卵泡激素制剂

“巴斯特敏”是以卵泡激素（是女性激素的一种，也称雌激素）中的炔雌醇和雌二醇作为有效成分而配制的药品。

卵泡激素是主要由卵巢分泌出控制“女性气质”和“阴道润滑”的激素。但伴随老化或心理压力，卵巢机能会衰退，进而使卵泡激素分泌减少。在绝经期或心理压力下引起卵泡激素的分泌急剧减少时，会出现潮热、发汗、变神经质而烦躁、或至性唤起障碍和性欲冷淡等各种全身不适症状，即妇女更年期障碍。同时，因绝经后卵泡激素不再分泌，导致性器官萎缩和性生活困难。

“巴斯特敏”软膏可以通过皮肤补充缺失的卵泡激素，从而改善以上症状。其特点是对肝脏温和，仅需少量就可补充好卵泡激素。

禁止事项



注意事项

（不能遵守以下事宜，会使目前症状恶化，或易产生副作用）

1. 有以下情况者不能使用

- (1) 对本药剂或本药剂中成份有敏症史者。
- (2) 使用前，挤出约3毫米药剂，擦涂于大腿内侧皮肤浅薄处，翌日出现药疹、发红、瘙痒、发疹、红肿者。
- (3) 被诊断为以下症状者。

雌激素依存性肿瘤（如乳腺癌、子宫内膜癌、卵巢癌）[本药剂的有效成份对乳房和子宫恶性肿瘤患者，可能会加快病情进展]、血栓症状、心脏病、脑溢血、严重的肝功能障碍、子宫肌瘤、子宫内膜异位、子宫内膜增生症、癫痫

- (4) 家族或本人有恶性肿瘤病史者。
- (5) 生理期、非正常阴道出血、有阴道分泌物（白带）者。
- (6) 孕妇或可能妊娠的女性、哺乳期妇女。
- (7) 儿童。

2. 以下部位不能使用

- (1) 眼及眼部周围、粘膜（口腔、鼻孔等）。
- (2) 外伤、湿疹、溃烂、炎症及严重化脓的部位。

3. 使用本制剂期间，不能食用以下药品及食品。

其他女性激素药剂、利福平、抗癫痫药、HIV逆转录酶抑制剂、类固醇激素、蛋白酶抑制剂、含圣约翰草（St.John's Wort）的食品、依普黄酮、葡萄柚果汁。

4. 除本人使用外，不要黏附于他人

- (1) 使用后用肥皂和温水将手充分洗净。
- (2) 除本人使用外，注意不要黏附于他人。如有附着立即用水冲洗。
- (3) 涂抹部位可能与他人发生触碰时，请将涂抹处用肥皂和温水充分洗净。

5. 不能用于避孕。

- (1) 有避孕愿望者，强烈建议采取适当措施。
- (2) 使用本药剂可能引起月经周期改变，务须避用奥克二氏避孕法等应用月经周期和基础体温的避孕方法。

征询咨询

1. 有以下情况者，使用前务必向医师、药剂师或注册经销商咨询。

- (1) 接受医师治疗者。
- (2) 对药品等有过敏（发疹、发红、发痒、皮疹、红肿等）史者。
- (3) 被诊断为以下症状者。

高血压、肾脏病、高血脂症、胆囊疾病、低钙血症、糖尿病、肝功能障碍、系统性红斑狼疮、偏头痛。

2. 有以下情况者，应立即停止使用并持本说明书向医师、药剂师或注册经销商咨询

- (1) 使用后，出现以下症状者。

相关部位	症 状	相关部位	症 状
皮肤	发疹、发红、发痒、皮疹、红肿	消化器官	作呕、呕吐、食欲不振
乳房	疼痛、胀满	其他	头痛、浮肿、眩晕、耳鸣

- (2) 经血状态明显反常者。
- (3) 使用期间，发生月经或非正常阴道出血者。
- (4) 使用两周前后而症状无改善者。
- (5) 未按规定使用药剂者。

其他注意事项

1. 初次使用本药剂前，建议作乳房和子宫的医学检查。
2. 本药剂连续使用3个月以上者，请每6个月，作一次以上的乳房和子宫定期检查。

请续读背面。

■ 功能主治 ■

妇女更年期障碍、因卵泡激素不足引发机能障碍、女性生殖器发育不全、闭经、痛经、经期异常、卵巢功能失调、功能性子宫出血、缺乳、不孕症、性欲缺乏、手足厥冷。

【用语解说】妇女更年期障碍：因老化或心理压力，引起卵巢机能衰退，使女性激素分泌减少，发生各种各样的自律神经失调症状（脸潮红、潮热、发冷、烦躁等）。

■ 用法用量 ■


以适当药量用于局部涂抹

[注意]

- (1) 务必严守规定的用法和用量。
- (2) 切勿接触眼睛。万一进入眼睛，应立即用清水或温水洗净。症状严重者，务须接受眼科医生诊疗。
- (3) 使用前，请将手指清洗干净。
- (4) 将涂抹部位清洁后使用。
- (5) 仅限于外用。

■ 详细用法 ■

- 一日一次（洗浴后就寝前）或二次（早、晚），将本药剂从软管取1厘米（参照右图）到手指上，均匀涂抹于手臂、腿部、腰部等部位。
- 从月经结束起，可使用两周。之后，应待下个月经结束前停用。
- 绝经后或因月经不顺而长期停经者（妊娠中不可使用），可即刻使用。使用两周后，应停用两周以上。
- 症状发生于泌尿器官、生殖器官的，请直接涂抹于外阴部。
- 已改善的症状复发时，请按同样的方法使用。



■ 成份 ■

1克当中含有以下有效成份

有效成份	1克当中	内容
炔雌醇	0.2毫克	合成卵泡激素
雌二醇	0.6毫克	卵泡激素

添加物中含有白凡士林、硬脂醇、单硬脂酸甘油酯、聚氧乙烯氢化蓖麻油 60、丙二醇、羟苯甲酯、羟苯丙酯。

■ 贮藏注意事项 ■

1. 避开直射日光，置阴凉干燥处密封保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 为避免误用，保持品质，请勿换装其他容器。
4. 请勿使用过期制品。
5. 过多挤出本药剂时，不要收回到软管。

— 联系信息 —

大东制药工业株式会社 客户咨询处

电话 0120-246-717

接待时间 9:00~12:00、13:00~17:00

(节假日及本公司停业日除外)

制药销售单位



大东制药工业株式会社

山梨县甲府市川田町字正里624番地2-207

请续读背面。