

服用前请阅读本说明书并保管好，以便需要时查阅。

男性激素内服制剂

普利兹玛®激素片

第一类医药品

PRIZMA HORMONE TABLET

男性激素主要由睾丸间质细胞分泌，除先天性睾丸发育不良者外，睾丸机能随年纪增大而衰退，其结果出现体内男性激素的不足。

普利兹玛激素片，以含男性激素前驱物的猪睾丸提取物，及男性激素的甲基睾丸酮为主要成份，调配有增强肠胃机能和滋养强壮效果的多种草药，可改善中老年人因男性激素分泌不足引起的男性性欲减退、阳痿等症状。



注意事项



禁用事项

（不能遵守以下事宜，会使目前症状恶化，或易产生副作用）

- 以下情况者不可服用。
 - 患有或可能患有雄激素依赖性恶性肿瘤（例如前列腺癌）者
 - 肝功能障碍者
 - 女性
 - 未满 15 岁的小儿



征求咨询

- 以下情况者服用前，应向医师或药剂师咨询。
 - 接受医师治疗者。
 - 对药品等有过敏史者
 - 有如下症状者
排尿困难
 - 诊断为以下症状者。
肝脏病、前列腺增生、心脏病、肾脏病、糖尿病、高血压
 - 年老者
 - 未满 45 岁，可能患有精巢机能低下等病症者（本药剂原则上以 45 岁以上成人为对象）
- 服用后，有以下情况者，可能出现副作用，应立即停止服用，并持本说明书向医师或药剂师咨询

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、发痒
消化器官	恶心、呕吐、食欲不振
精神神经系统	过敏症状

偶有发生下记危重病症者，应立即接受医师诊治。

症状名	症 状
肝功能障碍	出现发热、发痒、发疹、黄疸（皮肤及眼白变黄色）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

- 服用 1~2 个月，症状仍无改善者，应持本说明书向医师或药剂师咨询。

【功能 主治】

阳痿、强精、机能性神经系统疾病、性欲冷淡、梦精、性欲减退、失眠症

【用法 用量】

成人一日3次，一次2片，餐后或餐间服用。

（视病况，可在2倍药量的限度内，逐渐增量使用。）

【关于用法用量的注意事项】

务必严守规定的用法和用量。

【症状解说】

- 阳痿：勃起能力衰退，性交时集中力下降，或中途萎缩的症状。
- 强精：增强精力。
- 机能性神经系统疾病：感受性快感的功能衰退的症状。
- 性欲冷淡：性欲淡漠，性功能衰退的症状。
- 梦精：中老年者因男性激素减少，失去正常的性感受机能的症状。
- 性欲减退：因激素失调发生的性欲及性功能失调的症状。与心理压力等有关联。
- 失眠症：中老年以上者，因男性激素分泌不足引起睡眠浅，入睡困难等症状。此为中老年者特有症状，须接受激素补充。

【成份】（本药品一日用量6片当中）

有效成份	睾丸提取物……………500毫克 （相当固体含量0.5毫克）	甲基睾丸酮……………5毫克
	橙皮·甘草提取物……………100毫克 （相当固体含量12.5毫克）	杜松树提取物……………100毫克 （相当固体含量4.5毫克）
	陈皮·当药·白芷·生姜提取物……………20毫克 （相当固体含量1.4毫克）	蓬莪术·大蒜提取物……………100毫克 （相当固体含量11.5毫克）
	榧木皮·牛龙提取物……………200毫克 （相当固体含量15.0毫克）	茴香·丁香·桂皮·牛肝脏提取物……………420毫克 （相当固体含量18.9毫克）
	肉豆蔻提取物……………10毫克 （相当固体含量0.2毫克）	
添加物	阿拉伯胶粉、海藻酸钠、巴西棕榈蜡、羧甲基纤维素钙、微晶纤维素、氧化钛、硬脂酸镁、精制紫胶、精制白糖、明胶、滑石、沉淀碳酸钙、玉米淀粉、乳糖水合物、羟丙基纤维素	

【贮藏注意事项】

1. 避开直射日光，置阴凉干燥处密闭保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 为避免误用，保持品质，请勿换装其他容器。
4. 请勿服用过期制品。

关于本制品的咨询，请向购买处药店或下记地址联系

原泽制药工业株式会社 顾客咨询室

电话（03）3441-5191

接待时间 9：30～17：00（节假日除外）

制药经销单位 

原泽制药工业株式会社

东京都港区高轮3丁目19番17号

TS1M27④