

服用前请阅读本说明书并保管好，以便需要时查阅。

男性激素内服制剂

普利兹玛[®]激素精

第一类医药品

PRIZMA HORMONE DRINK

男性激素主要由睾丸间质细胞分泌，除先天性睾丸发育不良者外，睾丸机能随年纪增大而衰退，其结果出现体内男性激素的不足。

普利兹玛激素精，以含男性激素前驱物的猪睾丸提取物，及男性激素的甲基睾丸酮为主要成份，调配有增强肠胃机能和滋养强壮效果的多种草药，可改善中老年人因男性激素分泌不足引起的男性性欲减退、阳痿等症状。



注意事项



禁用事项

（不能遵守以下事宜，会使目前症状恶化，或易产生副作用、发生事故）

- 以下情况者不可服用。
 - 女性
 - 未成年者
 - 被诊断为前列腺增生、前列腺肿瘤（恶性），接受治疗者。
- 服用后，请勿驾驶和操作各类车辆和机械。（因含有乙醇，恐引发睡意等）
- 本药剂不可用于注射。



征求咨询

- 以下情况者，服用前应向医师或药剂师咨询。
 - 接受医师治疗者。
 - 年老者。
 - 对药品等有过敏史者。
 - 有如下症状者。
 - 浮肿
 - 诊断为以下症状者。
 - 肝脏病、心脏病、肾脏病、糖尿病、高血压
 - 未满45岁，可能患有精巢机能低下等病症者（本药剂原则上以45岁以上成年人为对象）。
- 服用后，有以下情况者，可能出现副作用，应立即停止使用，并持本说明书向医师或药剂师咨询。

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、发痒
消化器官	恶心、呕吐、食欲不振
精神神经系统	过敏症状

偶有发生下记危重病症者，应立即接受医师诊治。

症状名	症 状
假性醛固酮增多症、肌病	手足无力、麻木、鼓胀感、僵硬、出现虚弱感和肌肉疼痛，并逐渐严重。

- 服用1~2个月，症状仍无改善者，应持本说明书向医师或药剂师咨询。
- 长期持续服用者，应征询医师或药剂师。

【功能 主治】

性欲减退、阳痿、强精、机能性神经系统疾病、性欲冷淡、失眠症、梦精

【用法 用量】

成人一日4次，早、中、晚餐前和就寝前服用。

1次服用量	
8克/瓶	1至2瓶
16克/瓶	用附带的小容器（约8克）1至2杯

每餐前服用。失眠症、手足厥冷、遗尿症者就寝前服用。劳累过度、运动过度、身心疲劳、登山等情况时可随时服用。按疲劳程度，用附带小容器（约8克）服用1至2杯。（早中晚睡前4次服用）

【关于用法用量的注意事项】

务必严守规定的用法和用量。

【症状解说】

- 性欲减退：激素失调发生的性欲及性功能失调的症状。与心理压力等有关联。
- 阳痿：勃起能力衰退，性交时集中力下降，或中途萎缩的症状。
- 强精：增强精力。
- 机能性神经系统疾病：感受性快感的功能衰退的症状。
- 性欲冷淡：性欲淡漠性功能衰退的症状。
- 失眠症：中老年以上者，因男性激素分泌不足引起睡眠浅，入睡困难等症状。此为中老年者特有症状，须接受激素补充。
- 遗精：中老年者因男性激素减少，失去正常的性感受机能的症状。

【成份】（本药品1日用量32克当中）

有效成份	睾丸提取物	9.6克	甲基睾丸酮	0.0016克
	杜松子乙醇浸出液	3.2克	橙皮·甘草乙醇浸出液	3.2克
	陈皮·当药·白芷·生姜乙醇浸出液	0.32克	蓬莪术·大蒜乙醇浸出液	2.56克
	梲木皮·牛龙乙醇浸出液	5.76克	茴香丁香桂皮牛肝脏乙醇浸出液	5.44克
	肉豆蔻乙醇浸出液	1.9克		
添加物	糖精钠水合物			

【贮藏注意事项】

1. 避开直射日光，置阴凉干燥处保存。
2. 保管于儿童无法触及之处。
3. 为避免误用，保持品质，请勿换装其他容器。
4. 请勿服用过期制品。

【包装】

8克×1、8克×4

关于本制品的咨询，请向购买处药店或下记地址联系

原泽制药工业株式会社 顾客咨询室

电话 (03) 3441-5191

接待时间 9:30~17:00 (节假日除外)

制药经销单位 

原泽制药工业株式会社

东京都港区高轮3丁目19番17号