

사사수루 (ササスルー)

2013년 3월 기재 요령 변경에 따른 개정

사용하시기 전에 이 설명서를 잘 읽으십시오.  
또한, 이 설명서는 사용이 끝날 때까지 소중히 보관해 주십시오.

生薬配合

便秘薬 「ササスルー」 第②類医薬品

( 생약 배합 )  
( 변비약 「사사수루」 제②류 의약품 )

규칙적인 변통은 쾌적한 생활을 보내기 위하여 매우 중요합니다.

변비가 되면 불쾌할 뿐 아니라 식욕 부진, 복부 팽만감 등의 증상을 일으킵니다.

계속된 변비에 의한 머리 무거움, 상기, 피부 트러블, 치질 등 여러가지 증상을 악화시킬 수 있습니다.

불쾌한 변비의 치료에는 자연에 가까운 배변을 얻을 수 있는 온화한 작용의 완하제를 이용하는 것이 적절합니다.

< 특징 >

「사사수루」는 알로에, 센나, 대황 외 5 종류의 식물성 생약을 배합한 변비약입니다.

대장 운동을 촉진시키고 완만한 하제 효과를 나타낼 생약 외, 위장 증상을 개선할 생약이나 혈액 순환을 돕고 상기 등을 개선할 부인병 처방 생약이 배합되어 있습니다.

그러므로, 고령의 고객이나 위장이 약한 여성분들도 복용하실 수 있습니다.

또, 작은 알약으로 증상에 맞추어 복용량을 세세하게 조절할 수 있습니다.

 사용 상의 주의



해서는 안 되는 것

(지키지 않으면 현재의 증상이 나빠지거나 부작용을 일으키게 됩니다)

1. 이 약제를 복용하는 동안은, 다음의 의약품을 복용하지 마십시오.  
다른 사제(하제)
2. 수유 중의 분들은 본제 사용을 피하고나 복용할 경우는 수유를 피하십시오.
3. 대량으로 사용하지 마십시오.



문의 상담하십시오

1. 다음과 같은 분들은 복용 전에 의사, 약사, 또는 등록판매자에게 상담하십시오.
  - (1) 의사의 치료를 받고 있는 분
  - (2) 임신 가능성이 있는 분
  - (3) 약 등에 의한 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 분
  - (4) 다음과 같은 증상이 있는 분  
심한 복통, 구역질, 구토

2. 복용 후 다음의 증상이 나타나는 경우 부작용 가능성이 있으니,  
즉시 복용을 중단하고 이 문서를 갖고 의사, 약사, 또는 등록 판매자에게  
상담하십시오.

관계 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
소화기	심한 복통, 구역질, 구토

3. 복용 후 다음의 증상이 나타날 수가 있으므로, 이런 증상의 지속 또는  
증강이 있었을 경우에는 복용을 중단하고 이 문서를 갖고 의사, 약사,  
또는 등록 판매자에게 상담하십시오.

설사

4. 1 주일 정도 복용해도 증상이 좋아지지 않을 경우 복용을 중단하고 이 문서를  
갖고 의사, 약사, 또는 등록 판매자에게 상담하십시오.

**【효능·효과】**

• 변비

• 변비에 따른 다음의 증상을 완화 :

머리 무거움, 상기, 피부 트러블, 식욕 부진,  
복부 팽만, 장내 이상 발효, 치질

**【용법·용량】**

	2.3 일 변통이 없을 때	4 일 이상 변통이 없을 때
성인(15 세 이상)	3~9 정	6~12 정
소아(11 세 이상 15 세 미만)	2~6 정	4~8 정
11 세 미만	복용하지 마십시오	

상기의 양을 하루에 한 번 취침 전에 복용하십시오. 단, 첫회는 최소량을 사용하여 변통의 상태를 보면서 조금씩 증량 또한 감량하십시오.

<용법, 용량에 관련한 주의>

- (1) 용법, 용량을 엄수하십시오.
- (2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시키십시오.
- (3) 변통 등 개선이 나타나면, 양을 줄이고 복용 간격을 띄우도록 하십시오.

**【성분, 분량과 작용】**

일일량(12 정)중

성분	분량	작용
알로에 분말가루	300mg	대장을 자극하여 연동 운동을 촉진시키고 배변을 원활히 합니다
센나 분말가루	500mg	
대황 분말가루	430mg	
계피 분말가루	100mg	위장 기능을 향진시키고 식욕 부진 등을 개선합니다
아술 분말가루	100mg	
당후박 분말가루	70mg	
작약 분말가루	240mg	변비에 의한 상기나 머리 무거움 등에 효과를 나타냅니다
천궁이 분말가루	180mg	

첨가물로서 “사사헬스(얼룩 조릿대 잎의 추출액)”, 부분 알파화 전분, 셀룰로오스, 규산 Al, 무수 규산, 인산 수소 Ca, CMC-Ca, 활석, 스테아린산 Mg, 히드로키시프로필 메틸셀룰로오스, 에틸셀룰로오스, 글리세린지방산 에스테르, 산화티타늄, 강클로로필린 Na 를 함유합니다.



발매원 : 株式会社 大和生物研究所  
( 주식회사 다이와 생물연구소 )  
長野県茅野市玉川字原山 11400-1018  
( 나가노현 치노시 다마가와 아자 하라야마 11400-1018 )

제조 판매원 : 福地製薬株式会社  
( 후쿠치제약주식회사 )  
滋賀県蒲生郡日野町寺尾 824  
( 시가현 가모우군 히노초 데라오 824 )