

服用时请务必阅读本说明书。并请妥善保管以便必要时可再阅读。



软便・腹泻・消化不良

正露丸糖衣 A[®]

第2类医药品
肠胃药

肠胃药 正露丸糖衣 A 是一百年前起受青睐至今的正露丸的姊妹产品，是家家户户（5 岁以上）使用的居家常备药。日本药典木馏油为天然成分，在不停止肠道运动的同时调整肠内水分的平衡，从而发挥其功效。特别对由于食物或饮水而引起的肠胃不适，消化不良时的软便、腹泻以及精神压力、感冒等引起的软便，腹泻等功效显著。本药为白色片剂，主要成分为日本药典木馏油，并配合老鹳草粉及黄柏干浸膏等生药。

[使用时的注意]



禁止事项



[不遵守以下事项会造成现在的症状进一步恶化，或容易引起副作用、事故]

- 以下情况者请勿服用。
 - 至今为止因服用本药或曾由本药成分引起过过敏症状者（皮肤发疹、发红、发痒、浮肿等）
 - 不满 5 岁的乳幼儿（有堵塞喉咙的危险）
 - 接受人工透析治疗者
- 在服用本药期间，请不要服用其他的止泻药。
- 请不要长期连续服用。
- 请勿将本药用于 [功效] 以外的目的。

咨询事项



- 以下情况者在服用本药之前请向医生、牙科医生、药剂师或注册销售员咨询。
 - 正在接受医生或牙科医生治疗者
 - 伴随发热的腹泻，大便带血、或带粘液并持续者
 - 孕妇，可能妊娠或正处哺乳期者
 - 高龄者
 - 本人或父母、兄弟姐妹中有过敏体质者
 - 因药物或化妆品等曾引起过敏症状者
 - 有肝脏或肾脏疾患者
- 服用后，如发生以下情况可能为副作用，请立即停止服用，并持本说明书向医生、牙科医生、药剂师或注册销售员咨询。

有关部位	症状
皮肤	发疹、发红、发痒、浮肿
消化器官	恶心、呕吐、便秘、食欲不振、胃部不适
精神神经系统	头晕、头痛

- 连续服用数日（大体的基准为 5~6 日）症状仍无改善时，请停止服用，并持本说明书向医生、牙科医生、药剂师或注册销售员咨询。

[功效]

软便，腹泻，因食物或饮水引起的腹泻，上吐下泻，泻肚，因消化不良引起的腹泻

（请继续阅读背面内容）

[用法・用量]

请在饭后（尽量于 30 分钟之内）务必用凉开水或温水服用以下用量。

年龄	单次服用量	1 日服用次数
成人（15 岁以上）	4 片	3 次
11 岁以上，未满 15 岁	3 片	
5 岁以上，未满 11 岁	2 片	
未满 5 岁	请勿服用	

[有关用法・用量的注意]

- (1) 请务必遵守规定的用法・用量。
- (2) 在给 5 岁以上的儿童服用时，为了避免弄错服用量或药剂堵塞喉咙，请在保护者的指导监督下使用。

[成分・分量]

12 片（成人在 1 日之内的最大服用量）中含有如下成分。

成分	分量	功能
日本药典木馏油 [*]	270mg	使大肠的过度的蠕动运动恢复正常，调整肠管内水分，肠内静菌
日本药典老鹳草粉	300mg	调整肠道运动
黄柏干浸膏	300mg	健胃作用，肠内静菌

作为添加物，还含有硅酸铝酸镁、合成硅酸铝、甲基纤维素、低取代羟丙基纤维素、羧甲基纤维素钙、硬脂酸镁。此外，糖衣层含有白糖、粉状阿拉伯胶、明胶、滑石粉、碳酸钙、氧化钛、羧甲基纤维素钠、聚乙二醇 6000、巴西棕榈蜡、白蜂蜡。

*一般来讲，被称为焦油的物质除可以指日本药典木馏油(CAS Reg. No. 8021-39-4)以外，还可以指从煤炭中提取的工业用焦油(煤焦油)(CAS Reg. No. 8001-58-9)。两者的原料、成分及用途都不同，是完全不同的物质。(CAS Reg. No. 为化学物质的固有的注册号码)

关于本公司产品的文献以及详细内容，可参考公司网站(<http://www.seirogan.co.jp>)或者询问公司顾客咨询处。

[保管及使用上的注意]

1. 请保管在小儿之手无法触及之处。
2. 为了避免误用及保持品质，请绝对不要调换放入其他容器内。
3. 请绝对不要把本药和其他药剂相混合。
4. 本药为白色有光泽的片剂。开封后要盖紧瓶盖，避免日光直射，并尽可能保存于阴凉处。此外，片剂偶有失去光泽或稍微变色的现象，但对使用无任何影响。
5. 瓶内的充填物是为防止在运输中片剂破损而放入的。开封后可丢弃。
6. 如受到强烈撞击片剂有可能会破裂。
7. 请勿使用超过使用期限的产品。

如果因为服用本药出现异状或有其他疑问时，请和购买的药店或下记部门联系。

大幸药品株式会社 顾客咨询处 电话：06-6382-1095

咨询时间：上午 9 点～下午 5 点（星期六、日和节假日除外）

关于副作用受害救济制度的咨询：（独）医药品医疗器械综合机构 电话：0120-149-931

制造及销售厂商



大幸药品株式会社

邮编 564-0032 日本国大阪府吹田市内本町 3 丁目 34 番 14 号