

請保存此說明書供日後參考。服用之前請務必仔細閱讀此說明書。

樋屋小兒綜合感冒藥 M (口服) <感冒藥>

第二类医药品

“樋屋小兒綜合感冒藥 M (口服)” 是可紓解多種由感冒引起的症狀的感冒藥。獲認可供年齡由 1 歲~ 14 歲的兒童服用。

加入了舒緩喉嚨痛，鎮壓咳嗽的南天果實提取物。

顆粒狀-楓葉糖漿味，兒童容易入口的口味。

使用注意事項 (雖然 樋屋小兒綜合感冒藥 M(口服)是兒童感冒藥，服用時需採用一般感冒藥的注意事項。)

[要避免] (不遵守以下事項可能導致感冒的症狀惡化或引起不良反應)

1. 下列人士服用本藥前需諮詢醫生，藥劑師，或認可銷售代理：(1) 對同類藥物或本藥的任何成份有過敏反應 (2) 服用這種藥物或任何其他感冒藥、解熱鎮痛藥後出現症狀哮喘 2. 本藥不應與下列藥物配合使用：含其它感冒藥，解熱劑和止痛劑，鎮靜劑，止咳化痰，或抗組胺藥(鼻腔粘膜炎，動暈症，或抗過敏劑，等口服藥物)口服藥物 3. 不要開車或服用本藥後操作機器。(本藥可能引起昏昏欲睡) 4. 服用前或服用本藥後不要飲酒。 5. 不要長時間服用本藥。

[請就以下情況諮詢醫生]

1. 有以下情況的人士,服用前請諮詢醫生、藥劑師或認可銷售代理：

(1) 正接受醫生或牙醫藥物診治 (2) 孕婦或有懷孕徵兆婦女 (3) 年老長者 (4) 有藥物過敏症狀記錄人士 (5) 任何人有以下症狀：發高燒，排尿困難 (6) 有以下病歷：心臟病，肝臟疾病，腎臟疾病，胃/十二指腸潰瘍，青光眼

2. 本藥可能引起下列不良反應。如出現這些反應，應立即停止服用本藥，及帶同此說明書去諮詢醫生，藥劑師或認可銷售代理。

皮膚...皮疹，紅腫，痕癢 消化器官...噁心，嘔吐，食慾不振

中樞神經系統...頭暈 泌尿系統...排尿困難 其他...體溫顯著下降

在極少數情況下可能會出現以下嚴重症狀。在這種情況下，應立即求醫。

- 休克(過敏性反應)... 皮膚痕癢，麻疹，聲音沙啞，打噴嚏，喉嚨痕癢，呼吸困難，心悸或意識模糊等

- 皮膚粘膜眼症候群(史帝芬強生症候群)，毒性表皮溶解症，急性廣泛發疹性膿疱症... 持續或突然惡化症狀：高燒，眼睛發紅，眼睛釋出分泌物，唇口糜爛，咽喉疼痛，廣泛皮膚範圍出現皮疹或紅斑，紅色圓形皮膚膿疱，精神萎靡，食慾不振等。

- 肝功能衰竭... 發熱，痕癢，皮疹，黃疸(皮膚和眼白變黃)，棕色尿，

一般煩躁不安，食慾不振等。

- 間質性肺炎 突發性或持續出現以下症狀：上樓梯或勞累之後呼吸急促或感到窒息，乾咳，發熱等
- 哮喘... 喘息和呼吸困難
- 再生障礙性貧血... 瘀斑，流鼻血，牙齦出血，發熱，皮膚蒼白和帶有黏液，乏力，心悸，氣促，感覺不適和頭暈，尿中有血等
- 粒性白血球缺乏症... 突發高燒，畏冷，咽喉痛等。
- 腎功能不全... 發熱，皮疹，尿量減少，一般腫脹，全身倦怠，關節痛，腹瀉等。

3. 服用本藥可能出現以下症狀。如果這些症狀持續或加重，請停止服用，並諮詢醫師，藥師，及帶同此說明書去諮詢醫生，藥劑師或認可銷售代理。... 口乾，昏昏欲睡

4. 如服用本藥 5~6 次後仍未見功效，立即停止服用本藥並帶同此說明書去諮詢你的醫生，藥劑師或認可銷售代理。

#### 主治

感冒症狀（流鼻涕，鼻塞，噴嚏，咳嗽、喀痰，咽喉痛、畏寒，發熱，頭痛，關節痛和肌肉酸痛）

#### 成份（每 3 包/4.5g）

Acetaminophen... 450mg      Tipepidine hibenazate... 37.5mg

Chlorpheniramine maleate... 3.75mg

Nandina fruit extract... 67mg (670mg as original crude drug)

添加物： Sucrose, Magnesium stearate, Calcium silicate, flavor, Ethyl vanillin, Vanillin, and Propylene glycol

#### 用法與用量

1 日 3 次，於飯後 30 分鐘內服用。

7 歲以上至 15 歲... 1 包                      3 歲以上至 7 歲以下... 2/3 包

1 歲以上至 3 歲以下... 1/2 包      1 歲以下... 禁止服用

#### [注意事項]

(1) 此藥應在成人監督下給兒童服用。(2) 2 歲或 2 歲以下兒童，服用前請諮詢醫生。(3) 請遵照建議劑量和服法。

#### 儲存和處理-注意事項

- (1) 請確保包裝密封，並儲存在陰涼乾燥的地方，避免陽光直射。
- (2) 請存放在孩童接觸不到的地方。
- (3) 為避免誤服及確保質量，切勿把此藥存放到另一個容器。

- (4) 切勿服用過期藥。
- (5) 為確保藥效,切勿服用開封後儲存過久的藥。

發 売 元

樋屋奇応丸株式会社

〒530-0043 大阪市北区天満 1-4-11

製造販売元

樋屋製薬株式会社 大阪工場

〒574-0014 大阪府大東市寺川 3-3-63