

請保存此說明書供日後參考。服用之前請務必仔細閱讀此說明書。

樋屋小兒止咳咀嚼片<止咳化痰藥>

指定第二类医药品

“樋屋小兒止咳咀嚼片”是可紓解咳嗽、喀痰的止咳化痰藥。獲認可供年齡由

5 ~14 歲的兒童服用。

只需咀嚼,毋需用水服用 小兒容易接受的彈珠汽水味 獨立包裝、便攜
無添加麻藥性成分 無人造色素 不含咖啡因

使用注意事項 (雖然 樋屋小兒止咳咀嚼片是兒童止咳藥,服用時需採用一般止咳化痰藥的注意事項)

[要避免] (不遵守以下事項可能導致感冒的症狀惡化或引起不良反應)

1. 下列人士不應服用本藥:對同類藥物或本藥的任何成份有過敏反應。 2. 本藥不應與下列藥物配合使用:含其它感冒藥,鎮靜劑,止咳化痰藥,或抗組胺藥等 (鼻腔粘膜炎,動暈症,或抗過敏劑,等口服藥物) 口服藥物。 3. 服用本藥後不要開車或操作機器。(本藥可能引起昏昏欲睡)

[請就以下情況諮詢醫生]

1. 有以下情況的人士,服用前請諮詢醫生、藥劑師或認可銷售代理:(1)正接受醫生或牙醫藥物診治 (2)孕婦或有懷孕徵兆婦女 (3)授乳期的婦女 (4)年老長者 (5)有藥物過敏症狀記錄人士 (6)有以下症狀人士:發高燒,排尿困難 (7)有以下病歷記錄:心臟病,高血壓,糖尿病,青光眼,甲狀腺疾病

2. 本藥可能引起下列不良反應。如出現這些反應,應立即停止服用本藥,及帶同此說明書去諮詢醫生,藥劑師或認可銷售代理

皮膚... 皮疹,紅腫,瘙癢 消化器官... 噁心,嘔吐,食慾不振

中樞神經系統... 頭暈 泌尿系統... 排尿困難

在極少數情況下可能會出現以下嚴重症狀。在這種情況下,應立即求醫。

- 過敏性症狀... 服用後出現皮膚痕癢,麻疹,聲音沙啞,打噴嚏,喉嚨痕癢,或呼吸困難等。
- 再生障礙性貧血... 瘀斑,流鼻血,牙齦出血,發熱,皮膚黏膜蒼白,乏力,心悸,氣促,感覺不適和頭暈,尿中有血等。
- 粒性白血球缺乏症... 突發高燒,發冷,咽喉疼痛等。

3. 服用本藥可能出現以下症狀。如果這些症狀持續或加重,請停止服用,及帶同此說明書去諮詢醫生,藥劑師或認可銷售代理... 口乾,昏昏欲睡

4. 如服用本藥 5~6 次後仍未見功效,立即停止服用並帶同此說明書去諮詢你的醫生,藥劑師或認可銷售代理。

儲存和處理-注意事項

(1)請確保包裝密封,並儲存在陰涼乾燥的地方,避免陽光直射。(2)請存放在孩童接觸不到的地方。(3)為避免誤服及確保質量,切勿把此藥存放到另一個容器。
(4)為確保本藥品質,如不需服用,切勿弄破鋁箔包裝。(5)切勿服用過期藥。

主治：咳嗽、喀痰

成份 (每 1 片)

主要成份：Tipepidine hibenzate... 3.125mg

Noscapine... 2.5mg

dl-Methylephedrine hydrochloride... 3.125mg

d-Chlorpheniramine maleate... 0.25mg

添加物：Hydrogenated maltose starch syrup, D-Mannitol, Potato starch, Calcium stearate, Calcium silicate, Hypromellose acetate succinate, Ethyl acrylate · methyl methacrylate copolymer, Polyoxyethylene nonylphenyl ether, Aspartame (L-Phenylalanine compound), Ethanol, Tocopherol, l-Menthol, and flavor

[注意]

服用此類藥物期間,尿液有時可能變成紅色。不必憂慮,因為這是由於 Tipepidine hibenzate 成份而造成。

用法與用量

每日三次,於飯後或睡前服用。將本藥放於口中咀嚼服用。

11 歲至 14 歲... 一次 4 片 8 歲至 10 歲... 一次 3 片

5 歲至 7 歲... 一次 2 片 5 歲以下... 禁止服用

[注意事項]

(1)請遵照建議劑量和服法。(2)此藥應在成人監督下給兒童服用。(3)取出藥片-如圖所示,手指用力壓向泡殼包裝 (PTP) 凸出部分,推破在後側鋁箔包裝的底部。

(為防損傷食管黏膜,小心避免誤吞鋁箔包裝)

発売元

樋屋奇応丸株式会社

〒530-0043 大阪市北区天満 1-4-11

製造販売元

日新薬品工業株式会社

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野 80-1