

# 中文說明

## L'amour Q


【第㊟類醫藥品】

### 功能和效果

用於更年期障礙、女性荷爾蒙失調症、月經不調、畏寒怕冷及與之伴隨的以下各種症狀：  
痛經、腰痛、頭痛、頭沉、上火、肩酸、耳鳴、眩暈、心悸、氣喘、失眠、歇斯底里、疲勞感、血色不佳

<女性荷爾蒙失調症是什麼……>

指伴隨月經、懷孕、分娩、產後、更年期等女性荷爾蒙的變動而出現的精神不穩定或焦慮等精神神經症狀及身體症狀



### 注意事項

#### □諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 曾有過因藥物等而引起過敏症狀的人士

2. 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	噁心、食欲不振

3. 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

軟便、腹瀉

4. 如果服用一段時間後症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

### 用法和用量

請按以下用量、在空腹時或就寢時以涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
成人（15 歲及以上）	2 片	2 次
未滿 15 歲	請勿服用	

## 成分和含量

本品4片中、含有：

日本藥典延胡索	0.91 g
日本藥典北纈草	0.61 g
日本藥典芍藥	0.61 g
日本藥典當歸	0.61 g
日本藥典桂皮	0.43 g
日本藥典川芎	0.30 g
日本藥典牡丹皮	0.30 g
日本藥典茯苓	0.24 g
日本藥典蒼朮	0.18 g
日本藥典地黃	0.15 g
日本藥典陳皮	0.15 g
日本藥典甘草	0.12 g
日本藥典香附子	0.12 g
日本藥典桃仁	0.12 g
日本藥典黃連	0.06 g
日本藥典生薑	0.03 g
日本藥典丁香子	0.03 g
日本藥典人參	0.03 g

含有上述比例的混合生藥乾燥提取物 500mg 和含有番瀉提取物 25mg、並含有：

日本藥典生育酚琥珀酸酯鈣鹽	10 mg
日本藥典煙鹼胺	10 mg
日本藥典泛酸鈣	10 mg
日本藥典葉酸	5 mg
日本藥典硝酸硫胺（維生素 B1）	5 mg
日本藥典吡哆醇鹽酸鹽（維生素 B6）	1 mg
日本藥典核黃素（維生素 B2）	1 mg
日本藥典氰鈷胺（維生素 B12）	10 $\mu$ g

為淺紅色薄膜衣片。

有關添加物：含有日本藥典輕質無水矽酸、日本藥典微晶纖維素、日本藥典二氧化鈦、日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典滑石、日本藥典糊精、日本藥典羥丙基甲基纖維素、日本藥典聚乙二醇 6000、氧化鐵黃、氧化鐵

## 保管及使用注意事項

- 1.請蓋緊蓋子存放於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.請勿以濕手觸碰本劑。如果用濕手觸碰、可能會導致薄膜出現斑點或者變色。
- 4.請勿服用瓶中的乾燥除臭劑。
- 5.瓶中的填塞物是為了避免運輸過程中片劑破損而放入的、請在開蓋後將其扔掉。但是、請將乾燥除臭劑保留於瓶中、在此狀態下進行存放。
- 6.如果瓶蓋沒有充分擰緊、則片劑可能會受濕氣等影響而變質、請每次服用後充分擰緊蓋子。
- 7.為避免誤用及為保持品質、請勿轉放入其他容器。
- 8.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11

<http://www.tsumura.co.jp/>